



### 針穿刺切片檢查後的護理

1. 請將冰袋（由我們提供的）放在您的胸罩內，置於敷料上方，當冰融化後即丟棄。請戴胸罩 48 小時，以使敷料固定就位。
2. 請在切片檢查兩天後取下敷料。您可在確保不移動無菌膠條位置的前提下，小心地清洗您的乳房。請注意不要使無菌膠條鬆動。
3. 您可能感覺輕微不適，且您的切片檢查部位可能出現青腫和腫塊。
4. 如果您需要藥物以治療不適，請服用 Tylenol 或超強 Tylenol。在 48 小時內，**請勿服用阿司匹靈或 IBUPROFEN**。
5. 在切片檢查後 24 小時內，請勿從事用力的活動，特別是在切片檢查胳膊的活動。
6. 注意是否出現大量出血、疼痛、腫脹或發燒。如果出現其中任何症狀，請致電乳房中心或您的醫生。如果是在下班時間，請前往 Summit 醫療中心急診部。我們將向您提供切片檢查後的處方止痛藥。放射醫師將在次日向您致電，並詢問您的感覺如何。
7. 我們將盡力在 48 小時內通知您病理結果，但如果切片檢查在星期五進行，則將在星期一通知結果。

謝謝您提供我們為您服務的機會。